



CHILDREN'S
HOME
SOCIETY OF
CALIFORNIA
www.chs-ca.org

추가적인 CHS 가족 교육 프로그램 자료는
(714) 712-7888 번으로 연락해 주시기 바랍니
다. CHS 조기 학습 및 교육 프로그램에 대한
자세한 내용은 (888) CHS-4KIDS 번으로 연락
해 주시기 바랍니다.

CHS 프로그램에 대한 가족 교육 프로그램 자
료, 팟캐스트 및 정보는 저희 웹사이트
www.chs-ca.org 에서도 찾아보실 수 있습니다.



Corporate Headquarters

1300 West Fourth Street
Los Angeles, CA 90017
(213) 240-5900
(213) 240-5945 Fax

C H I L D R E N ' S H O M E S O C I E T Y O F C A L I F O R N I A

아이가 너무 아프면 어린이 돌봄이에게 갈 수 없나요>

아프게 너무 아프다구요? 사인을 발견하세요



육아 중 아픈 아이를 돌보는 경우 결정 하긴 어려울 수 있습니다. 다음 질문은 당신의 결정을 안내하는 데 도움이 될 수 있습니다: 아이가 편안하게 프로그램의 정상적인 활동에 참여할 수 있습니까? 아이의 질병은 직원이 제공 할 수 있는 것보다 더 많은 관심을 필요로 할 것입니까? 아픈 아이가 다른 아이들의 건강과 안전에 영향을 미칠 것인가? 아픈 아이들이 집에 있는 경우, 모두가 건강을 유지할 것을 기억하십시오.



당신의 아이가 경구 발열의가 100° 이상 있는 경우, 그 또는 그녀는 육아에서 제외되어야한다:

- 부상과 관련이없는 비정상적인 반점, 발진, 또는 타박상
- 목의 고통이나 삼키기 곤란
- 감염된 피부 패치
- 비정상적으로 어두운, 차 색깔의 소변
- 회색 또는 흰색 대변
- 두통 어깨 결림
- 구토 (24 시간에서 2 번 이상)
- 비정상적인 행동 - 아이가 불안해하는 증상; 아이는 일반적으로 불편함을 느낀다거나 몸이 보인다; 아이가 평소보다 더 움
- 어린이 프로그램의 정상적인 활동에 참여할 충분한 생각을 하지 않았다
- 식욕 부진
- 귀앓이



아이의 증상이 지속되거나 악화 될 경우 의사와 상담하십시오. 육아 공급자는 개별 프로그램의 배제 정책을 따르는 것이 좋습니다. 부모가 오프 시간에 자신의 고용주의 정책을 잘 알고있는 그 예상치 못한 일에 다른 보육 서비스에 대한 백업 계획을 준비하면 도움이됩니다.

더 배우기

어린이를위한 서적

MR. PUTTER AND TABBY CATCH THE COLD

Cynthia Rylant, 일러스트 레이터 Arthur Howard

WHEN VERA WAS SICK

VeraRosenberry

성인을위한 서적

TAKING CARE OF YOUR CHILD

Robert H. Pantell, M.D., James F. Fries, M.D., & Donald M. Vickery, M.D.

CARING FOR YOUR BABY AND YOUNG CHILD

AmericanAcademyofPediatrics/StevenPShelov,M.D.,M.S.,F.A.A.P.

조직

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION

(800) 232-4636 또는 www.cdc.gov

**NATIONAL RESOURCE CENTER FOR HEALTH AND SAFETY
IN CHILD CARE AND EARLY EDUCATION**

(888) 227-5125 또는 <https://nrckids.org/CFOC>

어린이들이 많이 걸리는 질병

★ 발생 가능한 증상

★ 원인

★ 액션

결막염 (핑크 눈)	눈이 가렵고, 고통스러운 눈, 또는 눈꺼풀의 발적	바이러스, 박테리아, 눈물 차단. 물 콘 알레르기 또는 감기와 일반적입니다	자녀가 참여하기에 너무 불편 경우 제외, 방전 두껍고 흰색 또는 노란색, 또는 눈꺼풀이 매우 부어 또는 변색입니다. 항생제 안약을 적용한 후 24 시간 재입학.
중이염 (중이염)	귀앓이, 약간 정상 보다 높은 온도 이상, 또는 귀 에서 배출. 유아는 자신의 머리를 회전하거나 그의 귀를 잡아 당기, 면 고통을 느낄 것 입니다, 또는 과민성 됨으로써 고통을 나타낼 수 있습니다.	박테리아, 바이러스	아이가 열이있는 경우 제외, 보이거나 매우 아픈 역할, 귀에서 배수가, 또는 통증이 3 일 이상 지속됩니다.
감기	콧물 또는 코 막힘, 재채기, 눈물, 인후통, 기침, 근육통, 두통, 구토, 또는 설사	바이러스	자녀가 참여하기에 너무 아픈 경우 제외, 열이, 호흡 곤란이, 있거나 증상은 혈액 빨간색이나 부상과 관련이 없는 자주색 발진이 (가) 있습니다.
연쇄상 구균 인두염 (패혈성 인두염)	심한 목의 통증, 발열, 림프절, 또는 발진	타액과 직접 접촉을 통해 또는 재채기 또는 기에 의해 전염 되는 연쇄상 구균 박테리아	항생제 치료 후 24 시간이 시작과 발열이 통과 할 때까지 제외합니다.
기침		공기 입자와 직접 접촉 을 통해 확산 바이러스 성 감염; 또는 전염성이 없는 알레르기로 인해 발생할 수 있습니다	참여하거나 열이 너무 아픈 경우 제외합니다.
설사	어린이의 정상 패턴에 비교해 볼 때의 설사의 횟수, 설사 초과, 8시간이나 다섯번 이상의 설사	바이러스, 세균이나 기생충, 음식 과민 반응, 약물, 장 질환. 특히 대변 과 직접 접촉에 의 해 전파 전염성이 유형. 철저하게 기저귀 또는 배변 후에는 손을 씻으십시오!	의자는 복통, 8 시간없이 소변이, 피 묻은 또는 검정색 일 경우 제외, 발열, 대변에 점액, 아이가 눈 또는 피부가 노란색 표시, 병이 나타나거나 의자는 기저귀 나 화장실 에 포함되지 않습니다. 아이는 원인을 확인하기 위해 대변 배양을 해야 할 수도 있습니다. (더 배뇨, 구강 건조, 아니 눈물, 피부가 탄력을 잃게) 탈수에 주의합니다.
요충	자극과 항문 지역에 가려움증; 항문 지역에있는 흰색의 작은 벌레	기생충, 아이의 상처 부분은, 자신의 손가락 을 오염 시키고, 자신과 다른 사람을 감염시킵니다	처리 할 때까지 제외합니다.
농가진	빨강, 균열, 돌아 다니며, 물집 같은 여드름; 원형 스케일링 발진 (보통 얼굴에, 하지만 어디에나 있을 수 있습니다)	박테리아, 는 감염된 사람과의 접촉에 의해 전 파 또는 오염 된 표면	치료 후 24 시간이 시작 될 때까지 제외합니다.
백선	피부에: 상승 가장자리와 중앙 청산 빨간색 또는 어두운 스케일링 원형 패치; 두피 에: 빨강, 탈모의 머리카락이 끊어진 또는 패치 두피 스케일링	감염된 사람, 동물, 또는 오염 된 표면 과의 접 촉에 의해 전염 균 감염	치료 후 24 시간이 시작 될 때까지 제외합니다.
라이크	두피 근처의 머리에 머리 의 기지에서 가려움증, 작은 염증, 두피나 모발 에 보이는 이 (매우 작은 곤충), 볼 니트 (계란)	감염된 사람과 의 직접 접촉 하거나 감염된 사람 의 빗, 브러쉬, 의류, 침구 류 를 공유하여 확산 헤드스	처리 할 때까지 제외; 두 번째 치료를 해야 할 수도 있습니다. 니트의 철저한 제거는 성공적인 치료를 결정 하는 것이 중요합니다.
웬	종종 라인에 종종 손가락과 발가락 사이에 강렬한 가려움증, 붉은 융기 또는 물집	감염된 사람과 또는 감염된 사람 의 옷이나 침구 와 직접 접촉에 의해 전파 되는 진드기	치료 후 24 시간이 시작 될 때까지 제외합니다.
수두	발열, 오한, 두통, 몸통 에서 시작하여 바깥쪽으로 확산 발진, 그 이슬 방울 의 모양 으로 물집을 개발	수두 가 건조 될 때까지 바이러스는 감염된 사람과 의 직접 접촉 이나 공기 방울 에 의해 전파, 특히 이일 발진 하기 전에 나타납니다	물집을 건조시킬 때까지 아무도 48 시간 이내에 나타 나지 않았으면 제외합니다.
돌발	일반적으로, 24 개월 이하의 어린 영아 에서 발생; 1-2일 에 발진 이 3 또는 4 일 에 대한 열	인간 헤르페스 바이러스 6, 감염된 분비물 과 의 접촉을 통해 확산	발열이 경과 하고 발진이 가라 앉 때까지 제외합니다.
수막염	심한 두통, 고열, 수유 곤란, 구토, 정신 착란, 뺨뺨한 목과 허리, 혼수	바이러스 및 감염 과 접촉에 의해 전염 균, 사람, 동물, 곤충, 또는 오염 된 표면	의사 나 보건 당국은 아이가 돌아 갈 수 있음을 표시 될 때까지 제외.